



TÉCNICO EM ENFERMAGEM

igeduc

80 QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de ELIMINAÇÃO do candidato, é proibido: **folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital**; levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será ELIMINADO.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

- Cada um dos itens desta prova objetiva está vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o candidato marque, no cartão resposta, para cada item: o campo designado com o código V, caso julgue o item CERTO, VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o código F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.
 - Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva, o qual deve ser preenchido com cuidado pois marcações incorretas, rasuras ou a falta de marcação anularão a questão.
 - Para a análise dos itens (proposições / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicável, o texto a ele vinculado.
 - Nos itens que avaliem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
 - Você poderá consultar a cópia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulário de recursos em concursos.igeduc.org.br.
-

**QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(de 1 a 60)**

Julgue os itens a seguir.

01. O herpes-zóster decorre da reativação do vírus da varicela, que permanece em latência no sistema nervoso após a infecção primária. A reativação ocorre na idade adulta, sendo mais comum em pessoas imunocomprometidas.
02. A avaliação primária é um processo ordenado para identificar e corrigir, de imediato, os problemas que ameaçam a vida no curto prazo. A ênfase dessa medida é na avaliação rápida – XABCDE do trauma. O “X” descreve a necessidade de conter imediatamente hemorragias exsanguinantes, antes mesmo de iniciar a abertura das vias aéreas.
03. Os anticorpos protetores contra o tétano são induzidos tanto pela aplicação da vacina antitetânica, quanto pelo contato com a neurotoxina produzida pelo *Clostridium tetani*, que é capaz de causar a doença e também de conferir imunidade.
04. O profissional de enfermagem não pode disponibilizar o acesso às informações e aos documentos às pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da assistência à saúde do paciente, exceto quando autorizado pelo próprio paciente, por seu representante legal ou responsável legal, por determinação judicial.
05. A hanseníase virchowiana é a forma inicial da doença, surgindo com manifestações discretas e menos perceptíveis. Caracteriza-se por manchas na pele, em pequeno número, mais claras que a pele ao redor, sem qualquer alteração de relevo nem da textura da pele.
06. A transmissão da coqueluche se dá através de gotículas de saliva liberadas pelo doente por meio de tosse, espirro ou fala. O compartilhamento de objetos contaminados também pode transmitir essa doença.
07. Durante a preparação e acondicionamento do corpo após a morte de paciente com Covid-19, deve-se identificar adequadamente o cadáver, incluindo também a informação relativa ao risco biológico: agente biológico classe de risco 4.
08. A administração de fluidos em pacientes vítimas de queimaduras deve ser feita com solução cristalóide aquecida, preferencialmente com a solução Ringer Lactato. A recomendação é do uso de um volume de 2 a 4 mL/kg/% de área corpórea queimada, nas primeiras 24 horas.
09. A classificação operacional do caso de hanseníase é baseada no número de lesões cutâneas, de acordo com os seguintes critérios: Paucibacilar – casos com até cinco lesões de pele; Multibacilar – casos com mais de cinco lesões de pele.
10. A exérese é o tempo cirúrgico correspondente à separação dos planos anatômicos ou tecidos para abordagem de um órgão ou cavidade, através do rompimento da continuidade dos tecidos.
11. A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) deve ser emitida pela empresa do acidentado em até 48 (quarenta e oito) horas após o acidente. Em caso de morte, a CAT deve ser emitida imediatamente, e a morte comunicada à autoridade policial.
12. Os rins extraem os produtos residuais do sangue através de milhões de pequenos filtros, denominadas néfrons, que são as unidades funcionais dos rins.
13. Conceitua-se como abortamento a morte ovular ocorrida antes da 22ª semana de gestação. O abortamento é dito precoce quando ocorre até a 13ª semana; e tardio, quando ocorre entre a 13ª e 22ª semanas.
14. É considerado caso suspeito de esquistossomose todo indivíduo residente e/ou procedente de área endêmica com quadro clínico sugestivo das formas: aguda, crônicas ou assintomáticas, com história de contato com as coleções de águas onde existam caramujos eliminando cercárias. Todo suspeito deve ser submetido a exame parasitológico de fezes.
15. Uma criança pode apresentar um quadro importante de sofrimento respiratório em decorrência de uma crise de bronquite ou asma. O tratamento a ser feito é a base de broncodilatadores e a via de escolha é, principalmente, a inalatória. Após a inalação, a criança deve permanecer em observação por, pelo menos, trinta minutos a fim de ser reavaliada.

16. Os indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para Covid-19 devem iniciar o isolamento respiratório domiciliar imediatamente e esse poderá ser suspenso no 7º dia completo após a data da coleta da amostra, sem a necessidade de realizar novo teste, desde que permaneçam assintomáticos durante todo o período.
17. A alucinação consiste em um pensamento ou crença que não condiz com a realidade. A pessoa tem a sensação de que a mente está sendo controlada externamente. Ela confunde os pensamentos internos com a realidade, não conseguindo distinguir entre o que ela pensa e o que está acontecendo realmente no mundo.
18. O princípio da beneficência descreve que nenhum procedimento realizado pelo profissional da saúde pode causar dano ao paciente, ao contrário, ele deverá ser realizado visando apenas ao bem-estar do indivíduo, aliviando causas dos sofrimentos. É um princípio que obriga aumentar o quanto for possível o benefício e reduzir o prejuízo ao ser humano.
19. O transporte interno de resíduos de serviços de saúde deve ser realizado em horários não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de atividades. Esse transporte deve ser feito separadamente, de acordo com o grupo de resíduos e em recipientes específicos para cada grupo.
20. O nível de prevenção secundária compreende quaisquer atos destinados a diminuir a incidência de uma doença numa população, reduzindo o risco de surgimento de casos novos. A prevenção secundária consiste em um diagnóstico precoce e tratamento imediato.
21. Para a administração de dieta e as infusões de líquidos e de medicamentos através de uma sonda nasointestinal, deve-se posicionar o paciente sentado, no caso de ser acamado; manter a cabeceira elevada e não deitar o paciente logo após a ingestão alimentar e hídrica. Após a administração das dietas e dos medicamentos, deve-se lavar a sonda, a fim de manter sua permeabilidade, evitando obstruções.
22. O ferro é um micronutriente essencial para a vida e atua principalmente na síntese de células vermelhas do sangue (denominadas Hemácias) e no transporte do oxigênio no organismo. A deficiência de ferro leva ao desenvolvimento da anemia ferropriva.
23. Tanto a teníase quanto a cisticercose são doenças de notificação compulsória imediata. Os casos diagnosticados devem ser informados aos serviços de saúde em até 24 horas, visando mapear as áreas afetadas, para que se possa adotar as medidas sanitárias indicadas.
24. A medida terapêutica eficaz na difteria é a administração do soro antidiftérico, que deve ser feita em unidade hospitalar, e cuja finalidade é inativar a toxina circulante o mais rápido possível, possibilitando a circulação de excesso de anticorpos em quantidade suficiente para neutralizar a toxina produzida pelas bactérias.
25. Todo caso suspeito ou confirmado de cólera deverá ser notificado de forma imediata (em até 24 horas) pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar atendimento ao paciente, pelo meio mais rápido disponível.
26. O tratamento da gastroenterite causada por rotavírus é inespecífico e consiste fundamentalmente na prevenção e na correção da desidratação e do desequilíbrio eletrolítico, além do tratamento de outros sinais e sintomas, como náuseas, vômitos e febre. Deve-se manter a dieta alimentar normal e não se recomenda o uso de antimicrobianos nem de antidiarreicos.
27. O Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de Saúde Mental.
28. A ascite inscreve-se entre as manifestações mais comuns de descompensação da esquistossomose, com frequência iniciando-se na fase aguda sintomática da doença.
29. No atendimento à vítima de trauma abdominal com evisceração, deve-se manter o posicionamento adequado do paciente, não reintroduzir as vísceras; colocar compressas umedecidas com soro fisiológico; e realizar curativo compressivo. O tratamento definitivo para reposição dessas vísceras é realizado por meio de ato cirúrgico.
30. A fase pulmonar da ascaridíase é caracterizada por manifestações alérgicas, febre, bronquite, pneumonia, além de também haver edemaciação dos alvéolos. Na tosse produtiva, o catarro pode ser sanguinolento e apresentar larvas do helminto.
31. Na rotina dos serviços de saúde, a vacina poliomielite oral (VOP) é recomendada para crianças até 4 (quatro) anos 11 meses e 29 dias. Pessoas com 5 (cinco) anos de idade ou mais, sem comprovação vacinal ou com esquema incompleto, deverão receber a VOP, excepcionalmente, se forem viajantes residentes no Brasil que estiverem se deslocando para áreas com recomendação da vacina.
32. A Caderneta de Saúde da Criança utiliza como parâmetros para avaliação do crescimento de crianças os seguintes gráficos: perímetro cefálico, peso para a idade, comprimento/estatura para a idade e índice de massa corporal (IMC) para a idade.
33. O manual de enfermagem é um instrumento que reúne de forma sistematizada as normas, as rotinas, os procedimentos e outras informações necessárias para a execução das ações de enfermagem. O manual tem por finalidade esclarecer dúvidas e orientar a execução das ações de enfermagem, constituindo um instrumento de consulta.
34. São consideradas infrações moderadas as que provoquem perigo de morte, de debilidade permanente de algum membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
35. O conceito de incapacidade temporária é a perda total da capacidade de trabalho por um período limitado de tempo, nunca superior a um ano. É aquele em que o acidentado, depois de algum tempo afastado do serviço, devido ao acidente, volta executando suas funções normalmente.

36. A manifestação cutânea da Monkeypox ocorre após o início dos sinais e sintomas sistêmicos. A erupção cutânea da doença é progressiva e passa por diferentes estágios sequenciais específicos: máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas. As lesões são descritas como indolores até a fase de cicatrização, quando começam a apresentar prurido.
37. A administração da vacina antirrábica na profilaxia pós-exposição por via intradérmica deve ser realizada no esquema vacinal de 4 (quatro) doses, nos dias 0, 3, 7 e 14. O volume da dose é de 0,2ml, dividido em duas aplicações de 0,1mL, cada e administradas em dois sítios distintos, independente da apresentação da vacina.
38. A circulação pulmonar é o tipo de circulação na qual o sangue oxigenado sai do coração em direção ao corpo, irriga os tecidos onde ocorrem as trocas gasosas e volta para o coração rico em gás carbônico.
39. O tratamento da toxoplasmose adquirida em gestantes elimina o risco de infecção do feto. O início precoce do tratamento está associado à menor incidência e severidade de toxoplasmose congênita.
40. A gravidade do trauma cranioencefálico (TCE) pode ser avaliada através da Escala de Coma de Glasgow. É classificado como vítima de TCE moderado o paciente que apresenta Escala de Coma de Glasgow entre 14-15.
41. O complexo Teníase/Cisticercose é constituído por duas entidades mórbidas distintas, causadas pela mesma espécie de verme, durante as fases diferentes do seu ciclo de vida. A Teníase é provocada pela presença da larva da *Taenia solium* ou da *Taenia saginata*, no intestino delgado do homem. A Cisticercose é causada pela forma adulta da *Taenia solium* nos tecidos.
42. O tratamento da tuberculose em pessoas vivendo com HIV segue as mesmas recomendações para os não infectados, tanto na utilização dos fármacos quanto na duração total do tratamento.
43. O período pré-operatório mediato consiste na assistência prestada ao paciente em vigência de cirurgias eletivas e compreende o período desde a internação até as 24 horas antes da cirurgia.
44. O tipo de líder autocrático é o líder que se caracteriza pelo trabalho em conjunto ou participativo. Ele permite ao grupo efetuar sugestões e participar nas decisões, ao mesmo tempo em que a autoridade é exercida conjuntamente com o subordinado, resultando em obediência aprovada pelos demais colaboradores, sem a força do poder dominante.
45. O modo mais comum de transmissão da ancilostomíase é pela penetração ativa da larva pela pele, mas a penetração pode ocorrer também através da boca. Essa doença não se transmite de pessoa a pessoa, porém os indivíduos infectados contaminam o solo durante vários anos, quando não adequadamente tratados.
46. Os macronutrientes são três: Carboidratos, Proteínas e Vitaminas. Cada um deles exerce uma função específica no nosso corpo e representa as substâncias que precisamos em maior quantidade no organismo, estando presentes em maior quantidade nos alimentos.
47. A benzilpenicilina benzatina é o medicamento de escolha para o tratamento da sífilis adquirida, porém, não é uma opção segura e eficaz para o tratamento das gestantes com sífilis.
48. A higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, unidades de pacientes com doenças infecto-contagiosa e quando houver contato direto da vestimenta com material orgânico, deve ser de responsabilidade do empregador.
49. O esquema de administração via oral de vitamina A para crianças de 6 meses a 11 meses de idade é de uma dose de vitamina A na concentração de 100.000 UI, a cada seis meses.
50. No contexto da Síndrome Congênita associada à infecção pelo vírus Zika, a transmissão vertical, da gestante para o embrião ou feto, ocorre durante a gestação, e após o nascimento, através da amamentação. Neste último caso, é recomendada a suspensão do aleitamento materno.
51. A dieta branda é utilizada para pacientes com problemas mecânicos de mastigação e deglutição e para facilitar a digestão, bem como nos processos inflamatórios intestinais. É recomendada como dieta de transição para a dieta geral.
52. A hipodermólise é a introdução de líquidos no tecido subcutâneo, indicada para quadro de desequilíbrio hidroeletrólítico, principalmente com pacientes em cuidados paliativos e idosos com rede vascular de difícil acesso. O volume recomendado para administração por essa via é de 2000 mL em 24 horas ou 1000 mL por região.
53. O osso esterno é um osso chato, localizado na parte anterior do tórax, composto de três partes: o manúbrio, o corpo e o processo xifóide. O esterno serve para sustentação das costelas e da clavícula, formando a caixa torácica.
54. Os trabalhadores dos serviços de saúde devem ser capacitados para adotar uma mecânica corporal correta na movimentação de pacientes ou de materiais, de forma a preservar a própria saúde e integridade física. Nos procedimentos de movimentação e transporte de pacientes, deve ser privilegiado o uso de dispositivos que minimizem o esforço realizado pelos trabalhadores.
55. A leptospirose é uma zoonose transmitida pelo contato com a urina de animais infectados, de modo direto ou indireto, por meio do contato com água, lama ou solo contaminados.
56. O oxigênio dentro dos alvéolos pulmonares difunde-se até os capilares sanguíneos, penetrando nas hemácias, onde se liga com a hemoglobina, sendo o gás carbônico jogado para fora. Esse processo denomina-se hematose.
57. Da mesma forma que em crianças, a frequência das compressões na reanimação cardiopulmonar em lactentes será de 100-120 compressões/minuto, guardando a relação 15 compressões : 2 ventilações (5 ciclos ou 2 minutos) com um socorrista ou com dois socorristas.

58. É vedado ao profissional de enfermagem posicionar-se contra e denunciar aos órgãos competentes, as ações e os procedimentos de membros da equipe de saúde, quando houver risco de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao paciente, visando à proteção da pessoa, da família e da coletividade.
59. A síndrome disentérica crônica causada pela tricuriase ocorre em crianças com infecções intensas. As manifestações são diarreia intermitente com presença de muco e algumas vezes sangue, dor abdominal, anemia, desnutrição e em casos extremos prolapso retal.
60. Para os recipientes destinados à coleta de material perfurocortante nos serviços de saúde, o limite máximo de enchimento deve estar localizado 5 cm abaixo do bocal. O recipiente para acondicionamento dos perfurocortantes deve ser mantido em suporte exclusivo e em altura que permita a visualização da abertura para descarte.
67. A remuneração de João era de R\$ 1.302,00 e, após 15 dias, passou a ser R\$ 1.320,00. Assim, é correto afirmar que João foi beneficiado com um aumento salarial de 13,8%.
68. Advérbios são palavras invariáveis que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, e indicam circunstâncias como tempo, modo, lugar, intensidade, entre outras.
69. A acentuação gráfica não é importante para a compreensão da escrita e pode ser omitida sem prejuízo para a leitura.
70. Em português, os verbos podem ter mais de uma forma de participio.
71. Verbos na língua portuguesa são sempre conjugados no presente, nunca no passado ou no futuro.
72. Os advérbios introduzem ou concluem uma ideia e, por isso, só podem ser usados no início ou no fim de uma frase, não no meio.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (de 61 a 80)

Julgue os itens a seguir.

61. A função sintática de um termo em uma oração é determinada pela sua relação com os demais termos presentes na mesma. Essa relação pode ser de complementação, adjunção ou predicação.
62. No conjunto de valores 1, 12, 12, 12, 12, 1, a moda é um valor maior de 9.
63. A média de um conjunto de valor qualquer, composta por números reais, pares e positivos, é dada pela equação $(n + 1) / (n - 1)$, onde "n" é a quantidade de números que compõe o conjunto de valores analisados.
64. Considere os seguintes valores: 1, 3, 5, 7 e 9. A mediana desse conjunto de valores será um número ímpar.
65. O resultado da multiplicação de 16% por 4% e, em seguida, por 80%, é um valor inferior a 1%.
66. Sabe-se que 1 em cada 15 estudantes possui celular da marca X. Assim, é correto afirmar que menos de 7% dos estudantes possui um celular dessa marca.
73. A acentuação gráfica é uma convenção ortográfica que tem como objetivo indicar a sílaba tônica das palavras.
74. O sujeito sempre ocupa a posição inicial da frase na Língua Portuguesa.
75. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Tupanatinga, apenas será efetuada a extinção do Distrito mediante consulta plebiscitária da população interessada.
76. A instalação do Distrito será feita perante a Secretaria de Administração de Tupanatinga, segundo a Lei Orgânica do Município de Tupanatinga.
77. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Tupanatinga, os vereadores são violáveis no exercício do mandato.
78. Segundo a Lei Orgânica de Tupanatinga, é necessário preencher os requisitos previstos na legislação municipal para a criação de Distritos.
79. Segundo a Lei Orgânica do Município de Tupanatinga, a competência para zelar pela guarda da Constituição Federal de 1988 é concorrente.
80. De acordo com o disposto na Lei Orgânica do Município de Tupanatinga, compete ao Município, de forma concorrente, legislar sobre assuntos de interesse local.

RASCUNHO

PROIBIDO DESTACAR

RASCUNHO